

Termín a věk dítěte	Povinná očkování	Nepovinná doporučená očkování
Od 6. týdne (1. dávka)		Rotaviry <b>ROTATEQ</b>
3. měsíc (1. dávka)	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae b <b>INFRANRIX HEXA</b>	
3. měsíc (1. dávka)		Invazivní meningoková onemocnění skupiny B <b>BEXSERO</b>
		Invazivní pneumokoková onemocnění <b>VAXNEUVANCE</b>
3. měsíc (2. dávka)		Rotaviry <b>ROTATEQ</b>
4. měsíc (3. dávka)		Rotaviry <b>ROTATEQ</b>
5. měsíc (2. dávka)	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae b <b>INFRANRIX HEXA</b>	
5. měsíc (2. dávka)		Invazivní meningoková onemocnění skupiny B <b>BEXSERO</b>
		Invazivní pneumokoková onemocnění <b>VAXNEUVANCE</b>
Od 6. měsíce (přeočkování každý rok)		Onemocnění vyvolané virem chřipky <b>VAXIGRIP TETRA</b>
Od 9. měsíce, ideálně před nástupem do kolektivu (1. dávka)		Plané neštovice <b>VARILRIX</b>
2. dávka s odstupem 6 týdnů od 1. dávky		Plané neštovice <b>VARILRIX</b>
12. měsíc (3. dávka)	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae b <b>INFRANRIX HEXA</b>	
12. měsíc (3. dávka)		Invazivní meningoková onemocnění skupiny B <b>BEXSERO</b>
		Invazivní pneumokoková onemocnění <b>VAXNEUVANCE</b>

Od dovršeného 1. roku (1. dávka)		Žloutenka typu A <b>HAVRIX</b>
2. dávka nejdříve za 6 měsíců od 1. dávky		Žloutenka typu A <b>HAVRIX</b>
Od dovršeného 1. roku (1. dávka)		Klíšťová encefalitida <b>FSME-IMMUN</b>
2. dávka a další přeočkování dle sezóny (zrychlené/normální schéma)		Klíšťová encefalitida <b>FSME-IMMUN</b>
Od 1. - 2. roku (1. dávka)		Invazivní meningoková onemocnění skupiny A, C, Y, W135 <b>NIMENRIX</b>
18. měsíc (1. dávka)	Spalničky, zarděnky, příušnice <b>M-M-RVAXPRO</b>	

5. rok (1. dávka)	Záškrt, tetanus, černý kašel <b>BOOSTRIX</b>	
5. rok (2. dávka)	Spalničky, zarděnky, příušnice <b>M-M-RVAXPRO</b>	
11. rok (přeočkování)	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna <b>ADACEL-POLIO</b>	
Od 11. - 15. roku (1. dávka)		Onemocnění lidským papilomavirem <b>GARDASIL-9</b>
Od 11. - 15. roku (2. dávka) 6 měsíců po první dávce		Onemocnění lidským papilomavirem <b>GARDASIL-9</b>
Od dovršeného 14. do dovršení 15. roku (1. dávka)		Invazivní meningoková onemocnění skupina B <b>BEXSERO</b>
2. dávka po 1 měsíci od 1. dávky		Invazivní meningoková onemocnění skupina B <b>BEXSERO</b>
Od dovršeného 14. do dovršení 15. roku		Invazivní meningoková onemocnění skupina A, C, Y, W135 <b>NIMENRIX</b>

- Očkování bude probíhat v rámci pravidelných preventivních prohlídek
- Speciální očkování do exotických destinací (žlutá zimnice, virové hepatitidy A a B, břišní tyfus, vzteklna, japonská encefalitida, cholera) konzultujte s očkovacím centrem
- Veškeré informace týkající se očkovacích látek naleznete na [https://prehledy.sukl.cz/prehled\\_leciv.html#/](https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/)